

丙酮酸 (pyruvic acid PA) 含量测定试剂盒说明书

(分光法 48 样)

一、产品简介：

丙酮酸在各种生化途径中起着重要作用，可在糖异生过程中转化为碳水化合物，或通过乙酰 CoA 转化为脂肪酸。乳酸脱氢酶 (LDH) 可使丙酮酸转化为乳酸，同时使 NADH 氧化，利用 NADH 在 340nm 的下降量来计算丙酮酸含量。

二、试剂盒的组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂一	液体 40mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂二	粉剂 mg×2 支	4°C 保存	临用前甩几下使试剂落入底部，每支再加 0.6mL 蒸馏水溶解。用不完的试剂分装后 -20°C 保存，禁止反复冻融，一周内用完。
试剂三	粉体 mg×2 支	-20°C 保存	临用前甩几下使试剂落入底部，每支再加 0.6mL 蒸馏水溶解，可 -20°C 分装冻存，禁止反复冻融。
标准品	粉体 mg×1 支	4°C 保存	仅用来鉴定试剂盒中试剂是否正常（不参与结果计算）。 使用方法：用前标准管 (PA) 甩几下使粉剂落入底部，再加 0.5mL 蒸馏水混匀溶解即浓度为 100 μ mol/mL，再稀释 100 倍成 1 μ mol/mL 的 PA 后备用；按照加样表中测定管操作（样本更换成备用浓度标准品）。

三、所需的仪器和用品：

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿（光径 1cm）、台式离心机、可调式移液器、水浴锅、研钵、冰、蒸馏水。

四、丙酮酸 (PA) 含量测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：称取约 0.1g 组织，水分充足的样本可取约 0.5g，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆，12000rpm，室温离心 10min，取上清液待测。（若组织样本蛋白含量很高，可进行脱蛋白处理）

【注】：若增加样本量，可按照组织质量 (g)：提取液体积 (mL) 为 5~10: 1 的比例进行提取。

② 细菌/培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎（冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次），12000rpm，室温离心 10min，取上清液待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量 (10⁴)：提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

③ 液体样品：近似中性的澄清液体样本可直接检测；若为酸性样本则需先用 NaOH(2M) 调 pH 值约 7.4，然后室温静置 30min，取澄清液体直接检测。

2、上机检测：

① 紫外分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 340nm，蒸馏水调零。

② 试剂解冻至室温 (25°C)，或可放在 25°C 条件下水浴 5-15min。

③ 试剂一和二可按照 650:20 比例配成混合液（一枪加 670 μ L 该混合液）（该混合液用多少配多少，现配现用）。

④ 在 1mL 石英比色皿（光径 1cm）中依次加入：

试剂名称 (μ L)	测定管
样本	60
试剂一	650
试剂二	20
混匀， 25°C 下孵育 2min 后于 340nm 下读取 A1	
试剂三	20
混匀（轻轻晃动几下）， 25°C 下孵育 5min 后于 340nm 下读取 A2，（若吸光度继续下降，直到吸光值保持 2min 内稳定不变为止。） $\Delta A = A1 - A2$ 。	

【注】若 ΔA 小于 0.01，可以增加样本量 V1（如由 60 μ L 增至 100 μ L，则试剂一相应减少，保持总体积不变），或增加样本取样质量 W 和细胞数量，则改变后的 V1 或 W 或细胞数量，则改变后的 V1 或 W 需代入计算公式重新计算。

五、计算公式：

1、按照样品质量计算：

$$\text{丙酮酸 (PA) 含量} (\mu\text{g/g 鲜重}) = [\Delta A \div (\varepsilon \times d) \times V2 \times M_r \times 10^6] \div (W \times V1 \div V) = 174.7 \times \Delta A \div W$$

2、按照细菌或细胞密度计算：

$$\text{丙酮酸 (PA) 含量} (\mu\text{g/10}^4 \text{ cell}) = [\Delta A \div (\varepsilon \times d) \times V2 \times M_r \times 10^6] \div (500 \times V1 \div V) = 174.7 \times \Delta A \div 500$$

3、按照液体体积计算：

$$\text{丙酮酸 (PA) 含量} (\mu\text{g/mL}) = [\Delta A \div (\varepsilon \times d) \times V2 \times M_r \times 10^6] \div V1 = 174.7 \times \Delta A$$

ε ---NADH 摩尔消光系数， $6.3 \times 10^3 \text{ L/mol/cm}$; d ---96 孔板光径，1cm;

V ---加入提取液体积，1 mL;

$V1$ ---加入反应体系中样本体积，0.06mL;

$V2$ ---反应总体积， $7.5 \times 10^{-4} \text{ L}$;

M_r ---丙酮酸分子量，88.06;

W ---样本质量，g;

500---细菌或细胞总数，万。